

집합과 관계 그래프, 함수

집합의 표시법

조건제시법으로 집합  $P$ 를 정의할 때 조건명제(predicate)  $p(x)$ 를 이용하여,

$$P = \{x \mid p(x)\} \tag{1}$$

으로 쓰기도 하나, 집합  $P$ 에 **전체집합(universe)**  $U$ 를 특별히 드러내 표시하기도 한다.

$$P = \{x \in U \mid p(x)\} \tag{2}$$

**전체집합**  $U$ 를 표시하는 조건제시법 (2)는 두 가지 중요한 의미가 있다.

(1) 집합  $P$ 를 포함하는 전체집합(universe of discourse)  $U$ 를 특별히 밝힌다.<sup>1)</sup>

$$P \subseteq U \tag{3}$$

(2) **조건명제(predicate)**  $p(x)$ 에서 변수  $x$ 를 전체제안자(**universal quantifier**)  $\forall$ 을 이용하여,  $\forall x \in U$ 로 **한정(bind)**하였기 때문에,  $\forall x \in U: p(x)$ 는 **명제**<sup>2)</sup>가 된다.

이 강의에서는 자동기계(automata), 문법(grammar) 또는 프로그램을 이용하여 집합(언어)을 정의하는 방법을 배운다. 이는 집합(언어; languages)을 기계나 컴퓨터를 이용하여 표현하는 **새로운**<sup>3)</sup> 방법으로 여겨져 20세기 초 근대수학에서 매우 중요하게 받아들여졌다.

조건명제와 진리집합(truth set)

(정의) 조건명제  $p(x)$ 의 **진리집합**  $P \triangleq \{x \in U \mid p(x)\}$ 로 정의한다.


부분집합과 두 집합의 같음(same; equivalent)

(정의)  $A \subseteq B \triangleq \forall x \in A \Rightarrow x \in B$ . (4)

(정의)  $A = B \triangleq A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ . (5)

$$\equiv (\forall x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x \in B \Rightarrow x \in A).$$

(예)  $\{a, b, c\} = \{b, a, c\}$ ,  $\{F, T\} \neq \{0, 1\}$ .



충분조건  $p(x) \Rightarrow$  필요조건  $q(x)$

진리집합과 필요조건, 충분조건

(정의) 전체집합  $U$ 에서, 조건명제  $p(x)$ 의 **진리집합**이  $P = \{x \in U \mid p(x)\}$ 이고, 조건명제  $q(x)$ 의 진리집합이  $Q = \{x \in U \mid q(x)\}$ 이라 하자.  $P \subseteq Q$ 이면  $\forall x \in U: p(x) \Rightarrow q(x)$ <sup>4)</sup>이므로, 조건명제  $p(x)$ 는 조건명제  $q(x)$ 가 만족하기 위한 **충분조건**이라 부르고, 거꾸로 조건명제  $q(x)$ 는 조건명제  $p(x)$ 가 만족하기 위한 **필요조건**이라고 부른다. 또  $P \subseteq Q \wedge P \supseteq Q$ , 즉  $P = Q$ 이면, 조건명제  $p(x)$ 와 조건명제  $q(x)$ 는 각각 상대조건을 만족하기 위한 **필요충분조건** 또는 동치(equivalent) 명제라 부르고,  $\forall x \in U: p(x) \Leftrightarrow q(x)$ 와 같다.

1) 수학에서는  $x \in U$ 로 쓰고  $U$ 를 전체집합이라 부르나, 프로그래밍언어 Java나 C에서는  $U$   $x$ 로 쓰고  $U$ 를 변수  $x$ 에 **타입(type)**이라 부른다.

2) 명제는 참이나 거짓이 정해진 문장(statement)이다.

3) 이 노력은 1931년 Gödel의 불완전성 정리(Incompleteness Theorem)로 1929년(?) Hilbert가 꾸었던 아름다운 꿈이 실패라는 결론으로 이어져서, 현대수학에 한계를 드러내는 것이나, 2000여년 전에 피타고라스(Pythagoras)가 절망하였던 무리수  $\sqrt{2}$ 에 비밀을 풀어주는 열쇠가 되기도 한다.

4) 전체집합  $U$ 가 명백하면  $p \Rightarrow q$ 로 짧게 쓰기도 한다.

곱집합(Cartesian product)과 관계(Relation) 그래프(Graph)

(정의) 집합  $A$ 와  $B$ 의 **곱집합(Cartesian product)**을

$$A \times B \triangleq \{(a, b) | a \in A, b \in B\} \quad (6)$$

로 정의한다. 이 때 곱집합의 원소  $(a, b)$ 를 **순서쌍(ordered pair)**<sup>5)</sup>이라 부르고, 집합  $A \times B$ 의 크기는 집합  $A$ 의 크기와  $B$ 의 크기의 곱이다

$$|A \times B| = |A| \times |B|^{6)}.$$

(정의) 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는(from  $A$  to  $B$ ) **관계(relation)**  $R$ 은 두 집합  $A$ 와  $B$ 의 곱집합의 **부분집합**으로 정의한다<sup>7)</sup>.

$$R \subseteq A \times B \quad (7)$$

이때 집합  $A$ 를 관계  $R$ 의 **정의역(domain)**,  $B$ 를 **치역(range; co-domain)**이라 부른다.  $(a, b) \in R$ 일 때  $aRb$ 로 쓰기도 한다.

(생각문제) 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는 서로 다른 관계  $R$ 은 모두 몇 가지나 있을까?

(정의) 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는 관계  $R$ 의 **역관계**  $R^{-1} \subseteq B \times A$ 를 아래로 정의한다.

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A | (a, b) \in R\}$$

(정의) 관계  $R$ 의 정의역과 치역이 같은 집합  $A$ 일 때 **관계  $R$ 은 집합  $A$ 에서 정의한(on  $A$ ) 관계라** 부른다.

$$R \subseteq A \times A \quad (8)$$

(정의) 집합  $A$ 에서 **정의한** 관계  $E \subseteq A \times A$ 를 **에지**로 표현한 순서쌍  $G = (A, E)$ 을 집합  $A$ 의 **그래프**라고 정의한다.

관계에 성질(property)과 그래프

집합  $A$ 에서 정의한 관계  $R$ 을 에지(edge)로 하는 그래프  $G = (A, R)$ 에서, 관계  $R$ 이 특별한 성질을 만족할 때 그래프를 간단히 그릴 수 있다.

- (1) 관계가 **reflexive**<sup>8)</sup>하면, 모든 노드에서 자기 자신으로 가는 에지(self edge)가 **항상 있고**, **irreflexive**하면 self edge가 **항상 없으므로**, 관계가 reflexive인지 irreflexive인지를 미리 알고 있다면, 그래프에서 self edge는 따로 표시하지 않을 수 있다.
- (2) 양방향으로 모두 화살표가 있는 **symmetric**한 경우 에지에 화살표를 표시하지 않고 그냥 선으로 표시할 수 있다(undirected graph). **Antisymmetric** 또는 **asymmetric**하면 한 방향으로만 에지가 있는 것이므로, 에지에서 화살표를 빼고 선으로(undirected) 그래프로 간단하게 표현할 수도 있다. 다만 한 방향으로만 에지가 있는 antisymmetric이나 asymmetric일 때는 에지가 시작하는 노드를 위쪽에 그려서 그래프로 표현하기도 한다 (예: 뿌리나무(rooted tree)).
- (3) **Transitive**하면, 처음 노드에서 마지막 노드로 중간 노드를 통하여 에지가 연결하면, 반

5)  $(a, b) \neq (b, a)$ 이고  $\{a, b\} = \{b, a\}$ 인 집합과는 다르므로 순서쌍이라고 부른다.

6) **합집합**  $A \cup B$ 의 크기는  $|A \cup B| \leq |A| + |B|$ 임에 유의하라.

7) Let  $A$  and  $B$  be two sets. Then we define a binary relation  $R$  from the (domain) set  $A$  to the (range) set  $B$  is a subset of the Cartesian product  $A \times B (R \subseteq A \times B)$ .

8) 관계의 성질인 i) reflexive와 irreflexive, ii) symmetric과 asymmetric, antisymmetric, iii) transitive에 정확한 정의는 강의TP나 이산수학 교과서를 참조하시오.

드시 처음 노드에서 마지막 노드로 에지가 직접 있는 경우이다<sup>9)</sup>. 모든 연결을 다 표시하는 것은 낭비이고 기본적인 연결 상황만을 나타내면 충분하고, 이 기본적인 연결 상황을 Hasse diagram이라 부른다.

- (예) 자연수의 집합  $N$ 에서 정의한 관계의 예  $(=, <, \leq) \subseteq N \times N$
- $= \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \in N \times N \mid a = b\}$   
reflexive, symmetric, transitive
  - $< \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \in N \times N \mid a < b\}$   
irreflexive, asymmetric, antisymmetric, transitive
  - $\leq \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \in N \times N \mid a < b \vee a = b\} = (< \cup =)$   
reflexive, antisymmetric, transitive

(정의) 집합 정의역과 치역이 같은 집합  $A$ 에서 정의한 관계  $R$ 은 **합성(composition 또는 곱(product))**이 쉽게 정의되므로 관계  $R$ 이 여러( $n$ )번 계속 곱하여지는 **반복곱  $R^n$**  ( $n \geq 0$ )을 아래와 같이 **recursive**하게 정의한다.

$$R^0 \stackrel{\text{def}}{=} id_A \quad \text{단 } id_A = \{(a, a) \mid a \in A\}^{10).}$$

$$R^n \stackrel{\text{def}}{=} R^n \circ R \quad n \geq 1. \quad (9)$$

관계의 p-closure

집합  $A$ 안에 있는 관계  $R$ 과 관계  $R$ 의 성질의 집합  $P = \{reflexive, symmetric, transitive\}$ 의 원소  $p \in P$ 의  $p$ -closure  $R'$ 을 아래와 같이 정의한다.

$R' \supseteq R$ 을 만족하는 집합  $A$ 안에 있는 관계 중에 성질  $p \in P$ 를 만족하는 **가장 적은** 관계이다.

(정의)  $A \subseteq B$ 일 때 집합  $A$ 가 집합  $B$ 보다 적거나 같다고 한다.

(예) Reflexive closure of  $R$ ,  $R' = R \cup id_A$ .

Symmetric closure of  $R$ ,  $R' = R \cup R^{-1}$ .

Transitive closure of  $R$ ,  $R^\dagger = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i \in N_1} R^i$ .

Reflexive and transitive closure of  $R$ ,  $R^* = R^0 \cup R^1 \cup R^2 \cup \dots = \bigcup_{i \in N_0} R^i$ .

함수(function)

(정의) 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는 **관계  $f$** 중 (1) 정의역  $A$ 의 **모든(total)** 원소  $a \in A$ 에 대하여 관계  $a f b$ (또는  $(a, b) \in f$ )가 있는  $b \in B$ 가 (2) 치역  $B$ 에 반드시 **하나만(unique)** 있는 경우, **관계  $f$ 를 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는 함수  $f$** 라 하고,

$$f: A \rightarrow B$$

로 표시하며 특히  $a f b$  또는  $(a, b) \in f$  대신  $f(a) = b$ 로 표시하기도 한다. 이 때 집합  $A$ 를 함수  $f$ 의 정의역(domain) 집합  $B$ 를 함수  $f$ 의 치역(range)이라 한다.

9)  $R$  is transitive.  $\stackrel{\text{def}}{=} \forall a, b, c \in A: a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c$ .

10)  $\forall R \subseteq A \times A: R \circ id_A = id_A \circ R = R$ .  $id_A$ 는 합성( $\circ$ )에 관한 항등원(identity element)이다.

$$f: A \rightarrow B, \text{ if } (f \subseteq A \times B) \wedge (\forall a \in A: \exists_1 b \in B, afb)$$

위의 조건 (1) 정의역에 모든 ...은 만족하지 않지만 (2) 치역에 하나만 ...은 만족할 때 관계  $f$ 를 부분함수(partial function)라 부르고,

$$f: A \mapsto B, \text{ if } (f \subseteq A \times B) \wedge (\forall a \in A: [(\exists_1 b \in B, afb) \vee (\cancel{\exists} b \in B, afb)])^{11)}$$

(1) (2)를 모두 만족하는 함수를 전체함수(total function)라 부르기도 한다.

$$f: A \rightarrow B, \text{ if } (f \subseteq A \times B) \wedge (\forall a \in A: \exists_1 b \in B, afb)$$

함수  $f: A \rightarrow B$ 의 역함수  $f^{-1}: B \rightarrow A$ 는 함수가 아니고 관계다.  $f^{-1}$ 가 함수가 되려면,

(1) 정의역  $B$ 에 모든 ...을 만족해야 하고, 즉

$$\forall b \in B: \exists a \in A: afb \text{ 또는 } \forall b \in B: \exists f^{-1}(b) \in A \text{ 이면}$$

함수  $f: A \rightarrow B$ 는 onto 함수(correspondence) 또는 surjection(전사함수)라 부르고,

$$|A| \geq |B| \text{ 이다.}$$

(2) 치역  $A$ 에 하나만 ...도 만족해야 한다. 즉

$$\forall a \in A: \exists_1 b \in B: afb \text{ 또는 } b \in B: \exists_1 f^{-1}(b) \in A \text{ 이면}$$

함수  $f: A \rightarrow B$ 는 one-to-one(1:1) 함수 또는 injection(단사함수)라 부르고,

$$|A| \leq |B| \text{ 이다.}$$

함수  $f: A \rightarrow B$ 의 역함수  $f^{-1}: B \rightarrow A$ 도 함수이면 함수  $f: A \rightarrow B$ 는 one-to-one onto 함수(1-1 correspondence; 짝짓기) 또는 bijection(전단사함수)이라 부르고

$$|A| = |B| \text{ 이다.}$$

집합에 동등(isomorphism<sup>12</sup>)

(정의)  $A \cong_f B \iff (\exists f: A \rightarrow B \wedge \exists f^{-1}: B \rightarrow A).$

$$\equiv \exists f: A \leftrightarrow B.$$

$A \cong_f B$ 일 때,  $|A| = |B|$ 이고 집합  $A$ 와 집합  $B$ 는 함수  $f$ 를 통하여(with respect to; w.r.t.) 동등(isomorphic)하다고 한다. 집합  $A$ 와 집합  $B$ 가 짝짓기 함수  $f$ 를 통하여 동등하다는 말은,  $B = f(A)$ 로  $A = f^{-1}(B)$ 로 나타낼 수 있기 때문이다.

짝짓기 함수<sup>13</sup>  $f$ 를 생략하고  $A \cong B$ 로 간단히 쓸 수도 있다.

(정의)  $|A| = |B| \iff A \cong B.$

두 집합이 동등할 때( $\cong$ ) 두 집합이 크기(cardinality)가 같다고 정의한다.

(예)  $\{a, b, c\} \neq \{1, 2, 3\}$  이지만  $\{a, b, c\} \cong_f \{1, 2, 3\}$ 이다. 이 때 짝짓기 함수  $f$ 는 무엇일까? 물론 집합의 크기는  $|\{a, b, c\}| = |\{1, 2, 3\}| = 3$ 으로 같다.

집합의 동등함( $\cong$ )은 집합의 같음(=)을 포함하는( $\supseteq$ ) 더 큰 개념이다.

(예) 학생 집합과 그 학생의 학번집합은 같지( $\subseteq, \supseteq$ )는 않지만 동등하다( $\cong_f$ ).

11) 부분함수의 조건을  $|f(a)| \leq 1$ 로 쓰는 책도 있다.

12) Equivalent(같음; same)와 구분하기 위하여 isomorphism(동등)이라는 다른 용어를 사용하였다.

13) 짝짓기 함수는 1-1 onto 함수를 뜻한다.

멱집합(Power Set)

(정의) 집합  $A$ 의 부분집합의 집합을 집합  $A$ 의 멱집합(power sets)이라 부르고  $2^A$  또는  $\wp(A)$ 로 쓴다.

$$2^A \triangleq \{B \mid B \subseteq A\}.$$

(예)  $2^{\{0,1,2\}} = \{ \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{1,2\}, \{0,2\}, \{0,1,2\} \}.$

(사실)  $|2^A| = 2^{|A|}.$

(증명) 생략.

(정의) 집합  $A$ 에서  $B$ 로 가는 함수의 집합을  $B^A$ 라 쓴다.

$$B^A \triangleq \{f \mid f: A \rightarrow B\}.$$

(예)  $\{T, F\}^{\{0,1,2\}} \triangleq \{ (0,F), (1,F), (2,F), \{ (0,F), (1,F), (2,T) \}, \{ (0,F), (1,T), (2,F) \}, \{ (0,F), (1,T), (2,T) \}, \{ (0,T), (1,F), (2,F) \}, \{ (0,T), (1,F), (2,T) \}, \{ (0,T), (1,T), (2,F) \}, \{ (0,T), (1,T), (2,T) \} \}$   
 $\cong \{ (F_0F_1F_2), (F_0F_1T_2), (F_0T_1F_2), (F_0T_1T_2), (T_0F_1F_2), (T_0F_1T_2), (T_0T_1F_2), (T_0T_1T_2) \}$   
 $\cong \{ 000_2, 001_2, 010_2, 011_2, 100_2, 101_2, 110_2, 111_2 \}$

(사실)  $|B^A| = |B|^{|A|}.$

(증명) 생략.

(정의) 집합  $A$ 가 유한하면  $B^A \cong B^{|A|}$ 이므로,  $B^n$ (단  $|A| = n$ )으로 간단히 쓰기도 한다.

(예)  $\{T, F\}^{\{0,1,2\}} \cong \{T, F\}^{\{a,b,c\}} \cong \{0,1\}^{\{1,2,3\}} \cong \{0,1\}^3$

(사실)  $B^n$ 는  $|B|$ -진수<sup>14)</sup> 길이  $n$ 짜리 문자열(string)<sup>15)</sup>이다.

(사실) 집합  $A$ 에 멱집합  $2^A$ 은 집합  $A$ 에서 집합  $\{0,1\}$ 로 가는 함수와 동등하다.

$$2^A \cong \{0,1\}^A.$$

(예)  $A = \{0,1,2\}$ 일 때,  $2^A = \{ \emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\} \}$   
 $\leftrightarrow_f \{ 0_00_10_2, 0_00_11_2, 0_01_10_2, 0_01_11_2, 1_00_10_2, 1_00_11_2, 1_01_10_2, 1_01_11_2 \}$   
 $\emptyset \leftrightarrow_f 0_00_10_2, \{0\} \leftrightarrow_f 1_00_10_2, \{1\} \leftrightarrow_f 0_01_10_2, \{2\} \leftrightarrow_f 0_00_11_2,$   
 $\{0,1\} \leftrightarrow_f 1_01_10_2, \{0,2\} \leftrightarrow_f 1_00_11_2, \{1,2\} \leftrightarrow_f 0_01_11_2, \{0,1,2\} \leftrightarrow_f 1_01_11_2.$

(증명)  $A = \{1, 2, \dots, n\}$ 라 하자,  $b_1b_2 \dots b_n \in \{0,1\}^n$ (단  $1 \leq \forall i \leq n: b_i \in \{0,1\}$ )  
 $b_1b_2 \dots b_n \leftrightarrow_f \{i \in A \mid 1 \leq \forall i \leq n: b_i = 1\}$

14)  $n$ -진수는  $n$ -진법을 말하는 것으로 위에 예는 이진수(binary number) 문자열이다.

15) 문자열(string)은 1-3에서 다시 자세히 다룬다.

관계를 함수로 표기하기

관계  $R \subseteq A \times B$ 이고  $a \in A$ 에 대하여  $aRb_1, aRb_2, \dots, aRb_k$ 일 때,

$R(a) = \{b_1, b_2, \dots, b_k\} \subseteq B$ 로 쓰기도 한다.

단  $k \geq 0$ 이고,  $k=0$ 이면  $\{b_1, b_2, \dots, b_k\} = \emptyset$ 이라 본다.

이 때  $R: A \rightarrow 2^B$ 으로 볼 수도 있다<sup>16)</sup>.

즉 관계  $R \subseteq A \times B$ 을 정의역이 집합  $A$ 이고, 치역이 집합  $B$ 의 **부분집합**으로 하는 **함수(set valued function)**로 볼 수도 있다<sup>17)</sup>.

---

16)  $R_1 \subseteq A \times B$ 이고  $R_2: A \rightarrow 2^B$ 이라고 할 때  $R_1 \leftrightarrow R_2$ 이고  $R_1 \cong R_2$ 이므로  $R_1 = R_2$ 로 볼 수 있다.

17) 관계  $R$ 은 함수인가 함수가 아닌가?